

Segítse betegeit a leszokáshoz vezető úton!

Hogyan segít a CHAMPIX betegeinek a leszokásban?

A dohányzás és a nikotinfüggőség

A csökkenő dopaminszint megvonási tünetként nyugtalanságot és ingerlékenységet okoz^{2,3}

Nikotin utáni sóvárgás, a megvonási tünetek csökkentéséhez szükséges dopamin miatti dohányzási kényszer^{2,3}

A felszabaduló dopamin örömeztést vált ki¹⁻³

A nikotin gyorsan eléri az agyba¹

A dohányzás nikotint juttat a szervezetbe¹

A nikotin fenntartja a dohányzás függőségét⁴

A dohányosok közül

40%

évente átlagosan két alkalommal is megpróbál leszokni⁵

Legalább 6

leszokási kísérlettel, mielőtt ez sikerül⁵



A CHAMPIX segítségével a dohányosok választhatnak, hogyan szeretnék leszokni⁷

A CHAMPIX kettős hatással rendelkezik⁷



Azonnal

amelyhez ki kell jelölni egy dátumot az azt megelőző 1-2 hétben



Fokozatosan

csökkentve a dohányzást a teljes leszokásig



Ismételt kezeléssel a visszaeső dohányosoknál

ELSŐDLEGES

A CHAMPIX blokkolja a nikotin bekötődését ami csökkenti a dohányzás pozitív megerősítését⁷, mint például a hangulatjavító vagy a mentális és fizikai élnkítő hatást⁴

MÁSODLAGOS

A CHAMPIX mérsékelt mennyiségű dopamint szabadít fel a nikotinhoz képest⁷, csökkente a sóvárgást és a megvonási tüneteket^{8,9}

A dohányzás nikotint juttat a szervezetbe¹

A nikotin gyorsan eléri az agyba¹



Adagolási útmutató⁷

A CHAMPIX dózisának fokozatos növelésével betegek megkezdhetik a nikotinmentes élet felé vezető útjukat⁷

NAP
1-3

0,5 mg tabletta naponta egyszer

NAP
4-7

0,5 mg tabletta naponta kétszer

NAP
8-84

1 mg tabletta naponta kétszer a kezelés végéig

A kezelés időtartama⁷

attól függ, betege hogyan szeretne leszokni a dohányzástól:

Azonnal:⁷

Dohányzás abbahagyása az 1-2. héten



12 HETES CHAMPIX KEZELÉS



Fokozatosan:⁷
24 HETES CHAMPIX KEZELÉS

50%-os csökkentés a 4. héten

75%-os csökkentés a 8. héten

A dohányzás abbahagyása a 12. héten

A KEZELÉS FOLYTATÁSA TOVÁBBI 12 HÉTIG

Hivatkozások

1. Dani JA, Harris RA. Nat Neurosci 2005;8:1465-70. 2. Zaniwaska M, et al. Pharmacol Rep 2009;61:957-65. 3. Coe JW, Brooks PR, Vetelino MG, et al. J Med Chem 2005;48:3474-77. 4. Benowitz NL. Ann Rev Pharmacol Toxicol 2009;49:57-71. 5. Ebbert JO, Hughes JR, West RJ, et al. JAMA. 2015;313:687-94. 6. Chaiton M, Diemert L, Cohen JE, et al. BMJ Open 2016;6:e011045. 7. CHAMPIX alkalmazási előírás 8. West R, Baker CL, Cappelleri JC, et al. Psychopharmacology 2008;197:391-7. 9. Gonzales D, Rennard SI, Nides M, et al. JAMA 2006;296:47-55.

A CHAMPIX a dohányzástól való leszokás elősegítésére javallott felnőtteknek. Kiadhatóság: Orvosi vényhez kötött gyógyszer (V)

CHAMPIX 0,5 mg filmtabletta (I); CHAMPIX 1 mg filmtabletta (II) Hatóanyag: (I) 0,5 mg vareniclin (tartarát formájában); (II) 1 mg vareniclin (tartarát formájában)

Kiszárlás: Champix 0,5 mg és 1 mg filmtabletta (11x0,5 mg + 14x1mg); Champix 1 mg filmtabletta (28x); Champix 0,5 mg filmtabletta (56x); Champix 1 mg filmtabletta (56x)

Bruttó fogyasztói ár: Champix 0,5 mg és 1 mg Filmtabletta (11x0,5 mg + 14x1mg): 9 907 Ft; Champix 1 mg filmtabletta (28x): 10 927 Ft; Ajánlott fogyasztói ár: Champix 0,5 mg filmtabletta (56x): 22 353 Ft; Champix 1 mg filmtabletta (56x): 22 353 Ft

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/champix-epar-product-information_hu.pdf



Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
MOM Park "A" épület
Tel: 06-1-488-3700
www.pfizer.hu
PP-CHM-HUN-0014

Lezárás dátuma: 2019. november 9.